

Medicamentos para la Diabetes: Antes de la cirugía o un procedimiento

Si le ha dado otras instrucciones su médico de la diabetes, por favor avísele a la enfermera.

Un día antes de la cirugía o procedimiento:

- Mientras siga comiendo su dieta habitual, tome todos sus medicamentos para la diabetes, incluyendo la insulina inyectada con la cena.
- **Instrucciones de Insulina:**
 - A la hora de acostarse, no tome ninguna insulina de acción corta (Humalog, Novolog, Apidra, Regular) a menos que su nivel de azúcar en la sangre sea más de 250 mg / dl.
 - A la hora de acostarse, si usted toma una insulina de acción prolongada (Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba, Ryzodeg):
 - Tome su dosis habitual si su azúcar en la sangre por la mañana es generalmente MAYOR que 100 mg / dl.
 - Disminuya su dosis habitual por 20%, si su azúcar en la sangre por la mañana es generalmente MENOS de 100 mg / dl. (Dosis habitual x 0.8 = cantidad de insulina que debe tomar la noche antes de su cirugía / procedimiento).

En la mañana de la cirugía o procedimiento:

- **Instrucciones de Insulina**
 - Si toma insulina de acción prolongada solamente por la mañana (Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba, Ryzodeg, NPH, 70/30):
 - Tome su dosis habitual si su azúcar en la sangre por la mañana es generalmente MAYOR que 100 mg / dl.
 - Disminuya su dosis habitual en un 20% si su azúcar en la sangre por la mañana es MENOS de 100 mg / dl.
 - Si toma insulina de acción prolongada dos veces al día: No tome la dosis de la mañana, pero siga las instrucciones anotadas en la sección “Un día antes de la cirugía,” para su dosis a la hora de acostarse.
 - Si toma insulina de acción corta por la mañana (Humalog, Novolog, Apidra, Regular): No tome esta dosis.
- No tome ningún medicamento para la diabetes en forma de pastillas.
- No tome ninguno de estos medicamentos inyectables para la diabetes: Adlyxin, Bydureon, Byetta, iDegLira, Saxenda, Soliqua, Tanzeum, Trulicity, Victoza.

Si toma Humulin R U-500 insulina:

- Deje que su cirujano sepa una semana antes de su procedimiento o cirugía.
- Hable con su médico de diabetes una semana antes de su procedimiento o cirugía.

Si usa una Bomba de Insulina:

- Deje que su cirujano sepa una semana antes de su procedimiento o cirugía.
- Hable con su médico de diabetes una semana antes de su procedimiento o cirugía.

- El día de su cirugía o procedimiento, informe a su enfermera acerca de su bomba de insulina. La enfermera decidirá si necesita quitarse la bomba.

**Para otros medicamentos para la diabetes, llame a su médico de la diabetes para obtener instrucciones.